


# Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

Hände und Haut

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Hände- desinfektion</b>	<b>Händedesinfektion hygienisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor dem Umgang mit Lebensmitteln.</li> <li>• Nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen (z. B. nach dem Windeln, nach der Begleitung von Kindern bei der Toiletten-, Töpfchenbenutzung), auch wenn Schutzhandschuhe getragen wurden.</li> <li>• Vor dem Kontakt mit Wunden (z. B. vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o. ä.).</li> <li>• Nach der Versorgung von Kindern mit Durchfall, Erbrechen oder Atemwegsinfekten.</li> <li>• Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen.</li> <li>• Bei erhöhter Infektionsgefahr mehrmals täglich.</li> <li>• Ggf. nach dem Naseputzen.</li> <li>• Ggf. nach dem Toilettenbesuch.</li> <li>• Bei Bedarf (z. B. bei Arbeitsbeginn).</li> </ul>	ASEPTOMAN® MED <hr/>	konz. 30 Sekunden	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende
 <b>Schutz</b>	<b>Hautschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Arbeitsbeginn.</li> <li>• Vor hautbelastenden Tätigkeiten.</li> <li>• Nach dem Händewaschen.</li> </ul>	DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM <hr/>		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende
 <b>Pflege</b>	<b>Hände- und Hautpflege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Arbeitsende.</li> </ul>	DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM <hr/>		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende
 <b>Reinigung</b>	<b>Händewaschung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu Arbeitsbeginn.</li> <li>• Bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. nach dem Spielen mit Sand oder Erde).</li> <li>• Nach der Toilettenbenutzung.</li> <li>• Nach Tierkontakt.</li> <li>• Bei Bedarf (z. B. am Arbeitsende).</li> </ul>	DESCOLIND COMFORT WASH <hr/>		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitende

# Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

## Fläche


	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Fläche</b>	<b>Fieberthermometer</b>	• Direkt nach Gebrauch.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES)	3 Minuten	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch vollständig abwischen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende
	<b>Spielzeug</b>	• Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES)	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederverbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeitende
	<b>Wickeltischauflage</b>	• Direkt nach Gebrauch.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES)	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende
	<b>Toilette, Waschbecken</b>	• Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES)	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende
	<b>Große Flächen z. B. Fußböden, Arbeitsflächen, Sanitärbereich</b>	• Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	OPTISAL® PLUS DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup>	1 % – 60 Minuten 3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

# Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

Sonstiges

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Sonstiges	<b>Arbeitskleidung</b>	• Sofortiger Wechsel nach Kontamination.	Desinfizierendes Waschverfahren		Maschinelle Aufbereitung bei mind. 65 °C.	Alle Mitarbeitende
	<b>Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Handschuhe</b>	• Bei Desinfektions- und Reinigungsarbeiten.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende
	<b>Chemikalienbeständige Handschuhe</b>	• Beim Umgang mit Konzentraten von Flächendesinfektions-, oder Reinigungsmitteln.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende
	<b>Unsterile Schutzhandschuhe</b>	• Bei möglichem Kontakt mit Blut, Erbrochenem oder Ausscheidungen. Bei möglichem Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material.	Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (geprüft nach DIN EN 455 Teile 1 bis 4)		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im ECO WIPES Spendersystem eingesetzt werden. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift